

LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE DE LA BIBLIOTHEQUE

58 rue du Chevaleret

75013 PARIS

Tel : 01 44 24 40 40

Fax: 01 44 24 40 41

www.labodelabibliotheque.fr



Horaires d'ouverture

Lundi au vendredi de 7h à 18h

Samedi de 8h à 12h30

(RER) (C) (M) (14) Bibliothèque François Mitterrand

AUTOPRELEVEMENT


Apporter les prélèvements le plus rapidement possible au laboratoire.
En cas d'impossibilité conservation quelques heures à température ambiante.

NOM..... PRENOM.....date de naissance :.....

Questionnaire :


Avez-vous des symptômes (douleur, rougeur, écoulement...):	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
avez-vous pris des antibiotiques il y a moins d'une semaine (contrôle après traitement) :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Quelle zone avez-vous prélevée	<input type="checkbox"/> gorge <input type="checkbox"/> urètre <input type="checkbox"/> gland <input type="checkbox"/> autre zone
A quelle heure avez-vous fait le prélèvement :	
Où avez-vous conservé le prélèvement avant d'arriver au laboratoire :	

AVEC LE TUBE ET LE COTON TIGE



1

2 PRELEVER LA ZONE



3



4

ne touchez pas le coton, ne le laissez pas tomber. S'il est tombé demandez un autre écouvillon.

AVEC L'ECOUVILLON



1

2 PRELEVER LA ZONE



3

ne touchez pas le coton, ne le laissez pas tomber. S'il est tombé demandez un autre écouvillon.

Le laboratoire vous a remis 2 écouvillons.

Le premier, un écouvillon simple à remettre dans son manchon.

Le second, un écouvillon à remettre et à casser dans un petit tube bouché contenant un liquide que le laboratoire vous a remis.

Suivez bien le protocole, ne touchez pas le bout de l'écouvillon avec vos doigts et si un des écouvillon est tombé par terre, demandez en un autre au laboratoire.

PRELEVEMENT URETRAL

- Introduire le coton tige dans l'orifice urétral sur environ 1cm (toute la partie cotonneuse)
- Faire tourner le coton tige sur les parois de l'orifice en récupérant les sécrétions et les cellules superficielles
- S'il y a un écoulement veiller à le récupérer également sur l'écouvillon
- Procéder de la même façon avec les 2 écouvillons

PRELEVEMENT AU NIVEAU DU PENIS, GLAND, PREPUCE

- Effectuer le prélèvement avec le coton tige au niveau de la surface du gland de votre pénis (et non de l'intérieur de l'urètre)
- Si nécessaire, soulever les plis de peau pour pouvoir atteindre les zones malades avec le coton tige et frotter à plusieurs reprises sur les zones atteintes pour récupérer des sécrétions et des cellules superficielles.
- S'il existe un écoulement ou une lésion purulente, récupérer le liquide sur le coton tige.
- S'il existe des vésicules fermées, rompre la vésicule, gratter le fond et récupérer le liquide et des cellules superficielles sur le coton tige.
- Signaler l'existence de vésicules (cloques) au secrétariat qui le reportera sur votre dossier.

PRELEVEMENT DE PEAU

- Effectuer le prélèvement avec le coton tige au niveau de la surface de peau concernée
- Si nécessaire, soulever les plis de peau pour pouvoir atteindre les zones malades avec le coton tige et frotter à plusieurs reprises sur les zones atteintes pour récupérer des sécrétions et des cellules superficielles.
- S'il existe un écoulement ou une lésion purulente, récupérer le liquide sur le coton tige.
- S'il existe des vésicules fermées (cloques), rompre la vésicule, gratter le fond et récupérer le liquide et des cellules superficielles sur le coton tige.
- Signaler l'existence de vésicules (cloques) au secrétariat qui le reportera sur votre dossier.

PRELEVEMENT DE GORGE

- Insérer délicatement l'écouvillon dans la bouche, en veillant à maintenir en contact avec les amygdales et le fond de la gorge
- frotter 3 ou 4 fois, puis retirez l'écouvillon sans toucher l'intérieur des joues, ni de la langue.

PRELEVEMENT DE LANGUE

- Insérer délicatement l'écouvillon dans la bouche, en veillant à maintenir en contact avec la langue
- frotter 3 ou 4 fois, puis retirez l'écouvillon sans toucher l'intérieur des joues.